

Lamotrigin

Patientinformation

Lamotrigin (Lamictal,) är en medicin som visat sig ha effekt mot depression vid bipolär sjukdom, särskilt som återfallsförebyggande behandling. Den har fått speciell användning för patienter med bipolär sjukdom eftersom den inte förorsakar överslag från depression till mani. Medicinen ger heller inte viktuppgång eller sexuella biverkningar. Medlet används också mot epilepsi.

Det är viktigt att trappa upp dosen av medicinen långsamt under de första veckorna enligt de instruktioner du fått av din läkare. Vanliga behandlingsdoser därefter är 50-400 mg per dygn, antingen som endos på morgonen eller uppdelat i morgon- och kvällsdos. Dosen utprovas individuellt. Blodprovskontroller är inte nödvändigt, men bestämning av lamotriginhalten i blodet kan i vissa fall vara av värde.

Lamotrigin kan i vissa fall ge hudutslag, särskilt under de första fyra veckorna. De hudutslag som kan uppkomma är oftast småprickiga eller småknottriga och kommer vanligen på bålen, armarna och ibland i ansiktet. Du ska inte fortsätta att ta medicinen om du får utslag. Kontakta din läkare snarast för en bedömning av orsaken till dina utslag. Om du skulle få kraftiga utslag och/eller feber i samband med att du börjar med Lamictalbehandlingen bör du kontakta läkare akut för bedömning.

Som regel har lamotrigin få och milda biverkningar men kan ibland, utöver hudutslag, ge besvär i form av huvudvärk, trötthet, darrning, yrsel samt magbiverkningar. Den långsamma dosupptrappningen under de första fyra veckorna minskar risken för biverkningar, framför allt från huden.